ПОСТРОЕНИЕ КРИВЫХ С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЁННЫХ ПОЛИНОМОВ БЕРНШТЕЙНА*

М. И. Григорьев   В. Н. Малозёмов

m_grigoriev@list.ru   malv@math.spbu.ru

25 июня 2008 г.

1°. Напомним, что базисные полиномы Бернштейна

$$b_k^n(x) = C_n^k\, x^k\, (1-x)^{n-k}, \qquad k \in 0:n,$$

можно определить с помощью производящей функции:

$$\bigl[xy + (1-x)\bigr]^n = \sum_{k=0}^{n} b_k^n(x)\, y^k.$$

В. С. Виденский рассмотрел более общую производящую функцию и ввёл обобщённые полиномы Бернштейна $p_k^n(x)$ [1, с. 39] :

$$g_n(x,y) := \prod_{i=1}^{n} \bigl[h_i(x)\, y + \bigl(1 - h_i(x)\bigr)\bigr] = \sum_{k=0}^{n} p_k^n(x)\, y^k. \tag{1}$$

Здесь $h_1(x), \ldots, h_n(x) : [0,1] \to [0,1]$ — непрерывные функции, удовлетворяющие условиям

$$h_i(0) = 0, \qquad h_i(1) = 1 \qquad \text{при всех } i \in 1:n. \tag{2}$$

Приведём некоторые свойства базисных полиномов $p_k^n(x)$ при фиксированном n. Согласно (1)

$$\begin{aligned} &p_k^n(x) \geqslant 0 \text{ на } [0,1] \text{ при всех } k \in 0:n;\\ &\sum_{k=0}^{n} p_k^n(x) \equiv 1. \end{aligned} \tag{3}$$

*Семинар по дискретному гармоническому анализу и геометрическому моделированию «DHA & CAGD»: `http://www.dha.spb.ru/`

В силу (2)

$$
\begin{aligned}
&p_k^n(0)=0, \quad k\in 1:n; && p_0^n(0)=1;\\
&p_k^n(1)=0, \quad k\in 0:n-1; && p_n^n(1)=1.
\end{aligned} \tag{4}
$$

Покажем, что

$$
\sum_{k=0}^{n} \tfrac{k}{n}\, p_k^n(x)=\varphi_n(x), \qquad x\in[0,1], \tag{5}
$$

где

$$
\varphi_n(x)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h_i(x).
$$

Для этого продифференцируем $\ln g_n(x,y)$ по y, после чего положим $y=1$. Получим

$$
\sum_{i=1}^{n} h_i(x)=\sum_{k=1}^{n} k\, p_k^n(x),
$$

что равносильно (5).

2°. Зафиксируем $x\in(0,1)$ и рассмотрим треугольный массив $\bigl\{p_k^j(x)\bigr\}$, $k\in 0:j,\ \ j\in 0:n$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. *Справедливы рекуррентные соотношения*

$$
\begin{aligned}
&p_k^j=\bigl(1-h_j(x)\bigr)\,p_k^{j-1}+h_j(x)\,p_{k-1}^{j-1}, \qquad k\in 1:j-1; \quad j\in 2:n;\\
&p_0^j=\bigl(1-h_j(x)\bigr)\,p_0^{j-1}, \qquad p_j^j=h_j(x)\,p_{j-1}^{j-1}, \qquad j\in 1:n;\\
&p_0^0=1.
\end{aligned} \tag{6}
$$

Доказательство. По определению

$$
\prod_{i=1}^{j}\bigl[h_i(x)\,y+\bigl(1-h_i(x)\bigr)\bigr]=\sum_{k=0}^{j} p_k^j\, y^k.
$$

При $j=1$ имеем

$$
h_1(x)\,y+\bigl(1-h_1(x)\bigr)=p_0^1+p_1^1\, y.
$$

Отсюда следует, что

$$
p_0^1=1-h_1(x), \qquad p_1^1=h_1(x).
$$

Пусть теперь $j\in 2:n$. Запишем

$$
\sum_{k=0}^{j} p_k^j\, y^k=\bigl[\bigl(1-h_j(x)\bigr)+h_j(x)\,y\bigr]\prod_{i=1}^{j-1}\bigl[h_i(x)\,y+\bigl(1-h_i(x)\bigr)\bigr]=
$$

$$
=\bigl[\bigl(1-h_j(x)\bigr)+h_j(x)\,y\bigr]\sum_{k=0}^{j-1} p_k^{j-1}\, y^k=\bigl(1-h_j(x)\bigr)\sum_{k=0}^{j-1} p_k^{j-1}\, y^k+
$$

$$+ h_j(x) \sum_{k=1}^{j} p_{k-1}^{j-1}\, y^k = \bigl(1 - h_j(x)\bigr)\, p_0^{j-1} + h_j(x)\, p_{j-1}^{j-1}\, y^j +$$

$$+ \sum_{k=1}^{j-1} \bigl[\bigl(1 - h_j(x)\bigr)\, p_k^{j-1} + h_j(x)\, p_{k-1}^{j-1}\bigr]\, y^k.$$

Сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях y, приходим к (6).

Предложение доказано. □

3°. Введём обобщённый полином Бернштейна с векторными коэффициентами

$$\mathbf{H}(x) = \sum_{k=0}^{n} \mathbf{a}_k\, p_k^n(x), \qquad x \in [0,1], \tag{7}$$

где $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n$ принадлежат $\mathbb{R}^s$. Согласно (4)

$$\mathbf{H}(0) = \mathbf{a}_0, \qquad \mathbf{H}(1) = \mathbf{a}_n. \tag{8}$$

Зафиксируем $x \in (0,1)$. Для вычисления $\mathbf{H}(x)$ построим треугольный массив $\{\mathbf{a}_k^j\}$ с помощью рекуррентных соотношений

$$\begin{aligned} &\mathbf{a}_k^j = \bigl(1 - h_{n-j+1}(x)\bigr)\, \mathbf{a}_k^{j-1} + h_{n-j+1}(x)\, \mathbf{a}_{k+1}^{j-1}, \quad k \in 0:n-j, \quad j \in 1:n; \\ &\mathbf{a}_k^0 = \mathbf{a}_k, \quad k \in 0:n. \end{aligned} \tag{9}$$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. *Справедливо равенство* $\mathbf{H}(x) = \mathbf{a}_0^n$.

Доказательство. Согласно (6) и (9) имеем

$$\mathbf{H}(x) = \mathbf{a}_0^0\, p_0^n + \mathbf{a}_n^0\, p_n^n + \sum_{k=1}^{n-1} \mathbf{a}_k^0 \left[(1 - h_n(x))\, p_k^{n-1} + h_n(x)\, p_{k-1}^{n-1}\right] =$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{a}_k^0 \bigl(1 - h_n(x)\bigr)\, p_k^{n-1} + \sum_{k=1}^{n} \mathbf{a}_k^0\, h_n(x)\, p_{k-1}^{n-1} =$$

$$= \sum_{k=0}^{n-1} \bigl[\bigl(1 - h_n(x)\bigr)\, \mathbf{a}_k^0 + h_n(x)\, \mathbf{a}_{k+1}^0\bigr]\, p_k^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{a}_k^1\, p_k^{n-1} = \cdots =$$

$$= \sum_{k=0}^{1} \mathbf{a}_k^{n-1}\, p_k^1 = \bigl(1 - h_1(x)\bigr)\, \mathbf{a}_0^{n-1} + h_1(x)\, \mathbf{a}_1^{n-1} = \mathbf{a}_0^n.$$

Предложение доказано. □

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. *При всех $j \in 1:n$ обобщённый полином Бернштейна $\mathbf{H}(x)$ допускает представление*

$$\mathbf{H}(x) = \sum_{k=0}^{j} \bigl(\Delta^k \mathbf{a}^{n-j}\bigr)_0 \, \sigma_k\bigl(h_1(x), \dots, h_j(x)\bigr), \tag{10}$$

где $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_j$ — основные симметрические полиномы от j переменных и

$$(\Delta^k \, \mathbf{a}^{n-j})_i = \sum_{p=0}^{k} (-1)^{k-p} \, C_k^p \, \mathbf{a}_{i+p}^{n-j}(x)$$

— конечная разность k-го порядка.

Доказательство. Напомним рекуррентные соотношения для основных симметрических полиномов:

$$\sigma_0(h_1, \dots, h_j) = 1, \quad \sigma_{j+1}(h_1, \dots, h_j) = 0, \quad j \in 1:n; \qquad \sigma_1(h_1) = h_1;$$

$$\sigma_k(h_1, \dots, h_{j-1}, h_j) = \sigma_k(h_1, \dots, h_{j-1}) + h_j \, \sigma_{k-1}(h_1, \dots, h_{j-1}),$$

$$k \in 1:j, \quad j \in 2:n.$$

Перепишем соотношения (9):

$$\mathbf{a}_k^0 = \mathbf{a}_k, \qquad k \in 0:n;$$

$$\mathbf{a}_k^j = \mathbf{a}_k^{j-1} + h_{n-j+1}(x) \bigl(\Delta \, \mathbf{a}^{j-1}\bigr)_k, \qquad k \in 0:n-j, \quad j \in 1:n.$$

При $j = 1$ формула (10) принимает вид

$$\mathbf{H}(x) = \mathbf{a}_0^{n-1} \, \sigma_0(h_1) + \bigl(\Delta \, \mathbf{a}^{n-1}\bigr)_0 \, \sigma_1(h_1) =$$

$$= \mathbf{a}_0^{n-1} + h_1 \bigl(\Delta \, \mathbf{a}^{n-1}\bigr)_0 = a_0^n.$$

Это равенство верно в силу предложения 2.

Сделаем индукционный переход от j к $j+1$. Имеем

$$\mathbf{H}(x) = \sum_{k=0}^{j} \Bigl[\bigl(\Delta^k \, \mathbf{a}^{n-j-1}\bigr)_0 + h_{j+1}(x) \bigl(\Delta^{k+1} \, \mathbf{a}^{n-j-1}\bigr)_0\Bigr] \sigma_k(h_1, \dots, h_j) =$$

$$= \mathbf{a}_0^{n-j-1} + h_{j+1}(x) \bigl(\Delta^{j+1} \, \mathbf{a}^{n-j-1}\bigr)_0 \, \sigma_j(h_1, \dots, h_j) +$$

$$+ \sum_{k=1}^{j} \bigl(\Delta^k \, \mathbf{a}^{n-j-1}\bigr)_0 \bigl[\sigma_k(h_1, \dots, h_j) + h_{j+1}(x) \, \sigma_{k-1}(h_1, \dots, h_j)\bigr] =$$

$$= \sum_{k=0}^{j+1} \bigl(\Delta^k \, \mathbf{a}^{n-j-1}\bigr)_0 \, \sigma_k(h_1, \dots, h_j, h_{j+1}).$$

Предложение доказано. □

Формула (10) наиболее содержательна при $j = n$:

$$\mathbf{H}(x) = \sum_{k=0}^{n} \big(\Delta^k \mathbf{a}\big)_0 \ \sigma_k\big(h_1(x), \dots, h_n(x)\big).$$

В этом случае коэффициенты $\big(\Delta^k \mathbf{a}\big)_0$ не зависят от x.

4°. Вернёмся к определению (7) обобщённого полинома Бернштейна. Согласно (3) вектор $\mathbf{H}(x)$ при фиксированном $x \in [0,1]$ является выпуклой комбинацией коэффициентов $\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, которые в геометрическом моделировании называются *полюсами*. Когда x изменяется от 0 до 1, вектор $\mathbf{H}(x)$ описывает кривую в пространстве $\mathbb{R}^s$. Назовём её *обобщённой кривой Безье*. В силу (8) эта кривая выходит из точки $\mathbf{a}_0$ (при $x = 0$) и заканчивается в точке $\mathbf{a}_n$ (при $x = 1$), не покидая выпуклую оболочку полюсов.

Если $h_i(x) = x$ при всех $i \in 1 : n$, то $p_k^n(x) = b_k^n(x)$, $k \in 0 : n$, и обобщённая кривая Безье становится обычной кривой Безье [2]. Ниже в качестве примера мы построим кривую Безье и обобщённую кривую Безье в $\mathbb{R}^2$ по полюсам

$$\mathbf{a}_k = \big(\tfrac{k}{n}\,,\, (-1)^k\big), \qquad k \in 0 : n. \tag{11}$$

5°. Запишем обычный полином Бернштейна для полюсов (11):

$$\mathbf{B}(x) = \sum_{k=0}^{n} \mathbf{a}_k \, b_k^n(x) = \Big(\sum_{k=0}^{n} \tfrac{k}{n}\, b_k^n(x), \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \, b_k^n(x)\Big).$$

При $h_i(x) = x$, $i \in 1 : n$, формула (5) принимает вид

$$\sum_{k=0}^{n} \tfrac{k}{n}\, b_k^n(x) = x, \qquad x \in [0,1].$$

В то же время

$$\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \, b_k^n(x) = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, (-x)^k \, (1-x)^{n-k} = (1-2x)^n.$$

Поэтому

$$\mathbf{B}(x) = \big(x, (1-2x)^n\big), \qquad x \in [0,1].$$

Соответствующая кривая Безье при $n = 6$ представлена на рис. 1.



Рис. 1. Кривая Безье

6°. Зафиксируем точки $t_1, \ldots, t_n$ из $\mathbb{R} \setminus [0,1]$ и, следуя [1], рассмотрим дробно-линейные функции

$$h_i(x) = \frac{x\,(1-t_i)}{x-t_i}\,, \qquad i \in 1:n. \tag{12}$$

Они непрерывны на $[0,1]$ и удовлетворяют условиям (2). Вычислим первые две производные

$$h_i'(x) = -\frac{t_i\,(1-t_i)}{(x-t_i)^2}\,, \qquad h_i''(x) = \frac{2t_i\,(1-t_i)}{(x-t_i)^3}\,.$$

Имеем $h_i'(x) > 0$ на $[0,1]$, так что все $h_i(x)$ строго возрастают. Далее $h_i''(x) > 0$ при $t_i > 1$ и $h_i''(x) < 0$ при $t_i < 0$. Значит, при $t_i > 1$ функции $h_i(x)$ строго выпуклы, а при $t_i < 0$ — строго вогнуты. На рис. 2 изображены две функции $h_i(x)$ при $t_i = -0.1$ и $t_i = 1.01$.



Рис. 2. Графики функций $h_i(x)$: (a) при $t_i = -0.1$; (b) при $t_i = 1.01$.

По функциям $h_i(x)$ вида (12) и полюсам (11) построим обобщённый полином Бернштейна

$$\mathbf{H}(x) = \sum_{k=0}^{n} \mathbf{a}_k\, p_k^n(x) = \Big(\sum_{k=0}^{n} \tfrac{k}{n}\, p_k^n(x),\ \sum_{k=0}^{n} (-1)^k\, p_k^n(x) \Big).$$

Согласно (5)

$$\mathbf{H}(x) = \Big(\varphi_n(x),\ \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\, p_k^n(x)\Big), \qquad x \in [0,1].$$

Эта формула определяет обобщённую кривую Безье на плоскости. Обозначим её $\mathcal{H}$. Кривую $\mathcal{H}$ можно перепараметризовать, положив $x = \varphi_n^{-1}(u)$. Такая замена корректна, поскольку функция $\varphi_n(x)$ строго возрастает на $[0,1]$ от значения 0 до значения 1. Получим

$$\mathbf{H}\big(\varphi_n^{-1}(u)\big) = \Big(u,\ \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\, p_k^n\big(\varphi_n^{-1}(u)\big)\Big), \qquad u \in [0,1].$$

Видим, что кривая $\mathcal{H}$ есть график скалярного полинома

$$\widetilde{H}(u) = \sum_{k=0}^{n}(-1)^k\, p_k^n\big(\varphi_n^{-1}(u)\big). \tag{13}$$

На рис. 3 представлена кривая $\mathcal{H}$ при $n = 6$. Узлы t_i выбраны так, как показано на рис. 4.



Рис. 3. Обобщённая кривая Безье

Рис. 4. Узлы t_i, $i \in 1:6$

На рис. 5 изображены графики базисных функций $p_k^n\big(\varphi_n^{-1}(u)\big)$ обобщённого полинома (13) в рассматриваемом частном случае.



Рис. 5. Графики базисных функций

7°. В принципе, функции $h_1(x), \ldots, h_n(x)$ и $\varphi_n(x)$, отображающие отрезок $[0, 1]$ на себя, могут быть и немонотонными. Возьмём в качестве $h_1(x)$ функцию, график которой представлен на рис. 6. Положим $h_2(x) \equiv h_1(x)$, $h_3(x) \equiv x$. На рис. 7 изображены четыре полюса и соответствующая обобщённая кривая Безье третьего порядка.



Рис. 6. График функции $h_1(x)$



Рис. 7. Обобщённая кривая Безье третьего порядка

ЛИТЕРАТУРА

1. Виденский В. С. *Линейные положительные операторы конечного ранга.* Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1985.

2. Григорьев М. И., Малозёмов В. Н., Сергеев А. Н. *Полиномы Бернштейна и составные кривые Безье* // Журн. вычисл. мат. и матем. физ. 2006. Т. 46. № 11. С. 1962-1971.